

# MÉDICAMENTS DE NIVEAU D'ALERTE ÉLEVÉ

## ATTENTION

### Double vérification requise !

TOUS ces médicaments administrés selon la voie indiquée exigent une double vérification indépendante lors de la préparation, de l'administration ou d'un changement de dose afin d'éviter de causer un préjudice sérieux à l'usager/résident.

Agents de contraste (I.V.)  
Adrénergiques (I.V. et S.Cut.)  
Agents neuromusculaires (I.V.)  
Agents de chimiothérapie (I.V. et P.O.)  
Agents inotropes (I.V.)  
Amines (I.V.)  
Anesthésiques généraux (I.V.)  
Antiarythmique (I.V.)  
Anticoagulants (I.V., S.Cut. et P.O.)  
Antidotes (I.V.)  
Antirejet (I.V. et P.O.)  
Barbituriques (I.V.)  
Benzodiazépines et Sédatifs (I.V.)  
Bloqueurs canaux calciques (I.V.)  
Dantrolène (I.V.)

Dextrose 50% (I.V.)  
Électrolytes concentrés (I.V.)  
Épidurales, Intra-Thécales et Bloc nerveux  
Époprosténol (I.V.)  
Formulations Liposomales (I.V.)  
Insulines (I.V. et S.Cut.)  
Narcotiques (I.V., Transdermiques et Liquides P.O.)  
Nitroprussiate (I.V.)  
Oxytocin (I.V.)

\*\*\* PÉDIATRIE \*\*\* (Sédatifs et Narcotiques)  
\*\* toutes les voies\*\*

Soluté hypertonique (I.V.)  
Solutions de dialyse  
Thrombolytiques (I.V.)  
Vasopressine (I.V. et Intraosseux)

### \* Exception \*

Lors d'une situation d'urgence ou menaçant la vie d'un usager/résident, l'autovérification est permise en répétant à voix haute les indications et les directives du médecin.

Toute autovérification doit être inscrite au dossier.

POUR SAVOIR SI UN PRODUIT SPÉCIFIQUE EST INCLUS DANS CETTE LISTE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE COMPLÈTE DES MÉDICAMENTS DANS LE PORTAIL INTRANET DU CISSS DES LAURENTIDES.