



## Pharmacothérapie soins palliatifs

Médicaments	Effets recherchés	Effets secondaires	Soins reliés à l'administration
<b>Anti-inflammatoires corticostéroïdes</b>  (Cortisone - Quar - Pulmicort - Decadron - Flovent - Prednisone)	Prévenir ou traiter des réactions inflammatoires	-Œdème -Gain pondéral -↑de la rétention sodique -Modification de l'humeur	-Exercice - Respect de la diète -Vérif la TA -Bien rincer la bouche - Aviser si effets importants
<b>Anti- inflammatoires non-stéroïdiens</b>  (Naprosyn - Advil - Motrin - ASA - Voltaren )	↓ de l'inflammation Soulagement de la douleur dû à l'inflammation	-Irritation gastrique -N° -Céphalée -Photosensibilité -Prurit	-Adm avec nour -Boire +++ -Éviter alcool -Protéger du soleil
<b>Analgésique</b>  (Codéine - Fentanyl - Empracet- Morphine - Démérol - Hydromorphe)	↓ ou supprimer les douleurs modérées à sévères	-N° - V° -Étourdissement -Dépression respiratoire -Toxicomanie	-Boire +++ -Se lever lentement -Surv SV -Surv Sat
<b>Anti-Convulsivant</b>  (Clonazépam - Rivotril - Dilantin - Epival - Neurontin)	Empêche les manifestations épileptique & Contrôler les convulsions	-Étourdissement -Incoordination -N° -V°	-Éviter alcool -Augmenter vigilance -Prendre avec nourriture
<b>Anxiolytiques - Sédatifs - Hypnotiques</b>  (Xanax - Diazépam - Ativan - Lorazépam - Valium)	Améliorer l'humeur, stimuler l'activité mentale et la vigilance, combattre la tristesse	-Sécheresse muqueuses (bouche, yeux, constipation) -N° - V° - Gain de poids	-↑ hydratation -Utiliser larmes  -Adm avec lait ou aliments -Ø abus de nourriture

# Protocole de détresse respiratoire

Versed	Sédatif - Anesthésique	↓ anxiété, effet amnésique, produire une sédation
Scopolamine	Anticholinergique	Effet amnésiant, ↓ sécrétions bronchiques
Morphine ou Hydromorphe (Dilaudid) (8x + puissant que la morphine)	Analgésique  Analgésique - Antitussif	↓ la sensation / douleur  Soulager douleur et toux Ø productive et exténuante

## Narcan =

C'est un antagoniste pur et spécifique des morphinomimétiques, sans effet agoniste. Il constitue l'antidote des morphinomimétiques. Lorsque la naloxone est injectée chez un sujet ayant reçu de la morphine, il en antagonise les effets.

**Il** se présente sous la forme d'une ampoule de chlorhydrate de naloxone de 1 ml (0,4 mg/ml).

La voie d'administration prioritaire est la voie intra-veineuse, mais lorsque cette voie est impossible ou difficile, le produit peut être administré par voie sous-cutanée ou intramusculaire.

## **Effets indésirables, souvent liés à des doses trop importantes (appel médecin)**

Frissons, sueurs - Érythème - Nausées - vomissements  
Excitation psychomotrice - anxiété - Retour brutal de la douleur  
Tachycardie - Hypertension artérielle - Oedème aigu pulmonaire

## **Échelle de Sédation (EDS)**

- 0** : Pas de sédation, patient bien éveillé
- 1** : Patient somnolent, mais stimulable verbalement
- 2** : Patient somnolent, mais stimulable tactilement
- 3** : Patient non réveillable, comateux