

**SÉQUENCE DES SYMPTÔMES LORS D'UNE RÉACTION ALLERGIQUE SÉRIEUSE
(RÉACTION ANAPHYLACTIQUE)**

ALIMENTS (NOIX, ARACHIDES, AMANDES, DÉRIVÉS OU AUTRES ALIMENTS) PIQÛRES DE GUÊPES OU D'INSECTES

Réaction systémique légère	<ul style="list-style-type: none"> • Sensation généralisée de chaleur, de picotement au visage, à la bouche, aux mains. • Rougeurs • Plaques d'urticaire • Parfois congestion nasale, autour des yeux 	<u>Peau</u>	<p align="center">QUOI FAIRE</p> <p>Dès les premiers symptômes, questionner sur ce que la personne a mangé ou touché.</p>
-----------------------------------	---	-------------	--

URGENCE URGENCE URGENCE URGENCE URGENCE URGENCE URGENCE URGENCE URGENCE

Réaction systémique moyenne	<ul style="list-style-type: none"> • Urticaire généralisée • Toux sèche • Dyspnée ou gêne respiratoire • Sifflement à la respiration (wheezing) • Anxiété • Imminence de danger 	<u>Bronchospasme</u> <u>Œdème des voies aériennes supérieures</u>	<p>Si la personne a été en contact avec l'allergène et présente des symptômes de réaction moyenne, on doit :</p> <p align="center">URGENCE D'INTERVENTION</p>
------------------------------------	---	--	--

Réaction systémique grave	<ul style="list-style-type: none"> • Stridor laryngé (bruit respiratoire sifflant et aigu) • Difficulté à parler • Sensation de gorge serrée • Sifflement ou wheezing • Serrement au thorax • Difficulté respiratoire • Nausée, vomissements, crampes abdominales • Hypotension • Étourdissement • Perte de conscience <p align="center">DÉCÈS</p>	<u>Œdème laryngé</u> (obstruction des voies respiratoires inférieures) <u>Bronchospasme</u> (obstruction des voies respiratoires inférieures) <u>Réactions digestives</u> <u>Colapsus cardio-vasculaire ou choc</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Administrer auto-injecteur d'adrénaline • Diriger vers l'urgence de l'hôpital avec le(s) médicament(s) utilisé(s) et noter l'heure de l'administration. <p align="center">AMBULANCE : 911</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appeler ensuite les parents pour qu'ils rejoignent le jeune à l'hôpital ou assurer le suivi. • Administrer l'auto-injecteur de réserve après 10 à 15 minutes si persistance des symptômes.
----------------------------------	---	--	---