

NOM : _____

Ponction veineuse

Compétence 14


Préparation adéquate du matériel

Matériel :

- **Barillet**
- **Tampon d'alcool ou de chlorhexidine avec alcool**
- **Garrot**
- **Diachylon (hypoallergénique PRN)**
- **Contenant biomédical**
- **Compresse**
- **Serviette ou piqué jetable**
- **Gants jetables ajustés**
- **Papillon #21, #23 ou #25 ou aiguille droite**
- **Adaptateurs pour papillon PRN**
- **Tubes de prélèvements**
- **Étiquettes de prélèvements**
- **Sac de plastique de type Ziploc pour y mettre les tubes**




Bloc 1 Préparation



	Pratique		Auto-Évaluation		Évaluation Enseignant	
	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non
1. *Vérifier l'ordonnance médicale, le PTI et le plan de soins pour voir s'il y a des restrictions : - Mastectomie - Fistule - Allergie au diachylon - Etc.						
2. Faire imprimer les étiquettes d'identification avec les codes barre selon les prélèvements demandés.						
3. *Se laver les mains						
4. Préparer le matériel requis et vérifier les dates d'expiration et l'intégrité.						
5. Déposer le matériel sur une surface propre et sèche.						
6. *Se laver les mains.						
7. Se présenter avec son titre.						
8. *Vérifier les freins.						
9. *Vérifier l'identité de la personne en la faisant nommer avec sa date de naissance et comparer avec le bracelet d'identité et les étiquettes d'identification des tubes.						
10. Expliquer la procédure à la personne.						
11. *Relever les ridelles et monter le lit à la bonne hauteur.						
12. S'assurer d'avoir un éclairage suffisant.						
13. Installer la personne dans une position confortable bras positionné sur un oreiller PRN						
14. Mettre le garrot à environ 7,5 à 10 cm au-dessus du site de la ponction.						
15. Déterminer le site de la PV : peau saine, veine non indurée, non pulsative, non noueuse.						
16. Défaire le garrot.						

Bloc 2 Étapes d'exécution de la ponction veineuse

	Pratique		Auto-Évaluation		Évaluation Enseignant	
	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non
17. Installer le piqué jetable sous le bras.						
18. Se laver les mains.						
19. *Adapter l'aiguille au barillet de façon aseptique.						
20. Placer les tubes de prélèvements à proximité et dans l'ordre d'utilisation.						
21. Positionner le coude de la personne en extension et bien appuyé.						
22. * Désinfecter le site de la ponction avec un tampon d'alcool ou de chlorhexidine avec un mouvement de va-et-vient. Laisser sécher 30 secondes.						
23. Mettre les gants jetables.						
24. Placer le garrot environ 7,5 à 10 cm au-dessus du site de la ponction sans contaminer le site désinfecté.						
25. Positionner le biseau de l'aiguille vers le haut et tendre la peau à 2,5 cm sous le site.						
26. Aviser la personne de prendre une grande inspiration et introduire l'aiguille dans la veine de 10 à 30 degrés avec la main dominante. Pour le papillon, pousser dans la veine jusqu'à ce qu'une goutte de sang soit visible dans la tubulure.						
27. Appuyer les doigts sur la peau pour stabiliser le barillet ou le papillon avec la main dominante.						
28. Introduire le tube de prélèvement avec la main non dominante et le pousser jusqu'au fond avec le pouce en se servant des ailettes du barillet.						
29. Prélever la quantité requise, retirer le tube et le remplacer par le suivant s'il y a lieu						
30. Si la pression est suffisante, desserrer le garrot après le 1 ^{er} tube sinon attendre à la moitié du dernier tube.						
31. Laisse le garrot en place moins d'une minute.						



	Pratique		Auto-Évaluation		Évaluation Enseignant	
	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non
32. Enlever le dernier tube avant de retirer l'aiguille.						
33. Déposer une compresse pliée en 2 sur l'aiguille sans appuyer et retirer l'aiguille.						
34. Déposer l'aiguille dans le contenant biorisque sans croiser les bras .						
35. Appliquer une pression sur la veine environ 15 à 30 sec. (2 min. si anticoagulants) et appliquer du diachylon.						
36. Renverser les tubes de bas en haut délicatement environ 8 à 10 fois sans agiter. (3 à 4 fois pour le tube bleu)						
37. Demander à la personne de continuer à maintenir une pression pendant 2-3 minutes supplémentaires (5 min. si anticoagulants).						
38. Ranger et disposer du matériel souillé. (Garrot à laisser dans la chambre).						
39. Enlever les gants et se laver les mains.						
40. Coller les étiquettes sur les tubes de prélèvements en revalidant l'identité. Inscrire la date et vos initiales si vous ne pouvez pas scanner vos prélèvements.						
41. Réinstaller la personne confortablement.						
42. S'assurer que la cloche d'appel est à la portée de la personne.						
43. Rester toujours à moins d'un bras de distance lorsque le lit est haut						
44. Relever les ridelles pour redescendre le lit.						
45. S'assurer que le nombre de ridelles relevées correspond à ce qui est indiqué au plan de soins avant de quitter.						
46. Désinfecter le dessous du plateau s'il y a lieu.						
47. Se laver les mains.						
48. Scanner les tubes et les placer dans un sac de plastique de type Ziploc.						
49. Acheminer les tubes au laboratoire.						

