

nom du pt : Ecrire sur étiquette.
date / concentration
nom du médicament + initial

* 1 papillon différ.
pour chaque
médication


INSTALLATION D'UN PAPILLON SOUS-CUTANÉ

INDICATION : Administration répétitive d'un médicament sous-cutané, beaucoup utilisé en soins palliatifs. , morphine, atirant, narco, scopolamine.

MATÉRIEL :

tape :

- Médication telle que prescrite
- Papillon #23 ou #25 avec ou sans bouchon caoutchouté
- Bouchon caoutchouté PRN
- 1 ou 2 pellicules transparentes (Opsite) (7 jrs max)
- Tampon d'alcool x 2



ÉTAPES


POINTS À RETENIR

- | | |
|---|--|
| <p>1. Se laver les mains.</p> <p>2. Rassembler le matériel.</p> <p>3. Faire la vérification des 5 bons avec la FADM.</p> <p>4. Désinfecter le bouchon de la fiole s'il y a lieu.</p> <p>5. Médicament en Vial : injecter une quantité d'air égale à la quantité de médicament à prélever.
Médicament en ampoule : Faire descendre tout le médicament dans l'ampoule en frappant le haut de celle-ci avec l'index ou en faisant tourner l'ampoule sur le comptoir. Casser le collet de l'ampoule avec le tampon d'alcool entre les doigts.</p> <p>6. Aspirer le médicament dans la seringue en ajoutant environ 0,2 ml pour le vide d'air du papillon.</p> <p>7. Adapter le bouchon caoutchouté au papillon s'il y a lieu.</p> | <ul style="list-style-type: none">• Éliminer les microbes• Éviter des pas inutiles.• Éviter les erreurs.• S'il s'agit d'un PRN, s'assurer que l'intervalle minimum est respecté.• Éviter la contamination.• Pour que le médicament soit plus facile à prélever.• Éviter de perdre une certaine quantité de médicament.• Éviter de se couper.• Certains papillons contiennent plus que 0,2 ml, cela dépend de la longueur de la tubulure.• Certains papillons ont déjà un bouchon caoutchouté. |
|---|--|

ÉTAPES

POINTS À RETENIR

8. Désinfecter le bouchon du papillon.
 - Éviter la contamination.
9. Piquer l'aiguille dans le bouchon caoutchouté et faire le vide d'air de la tubulure avec le médicament dans la seringue.
 - Si on fait le vide d'air de la tubulure avec autre chose que le médicament, la personne n'aura pas la dose complète.
10. S'assurer que ce qui reste dans la seringue correspond bien à la dose prescrite. Au besoin, retourner dans la fiole ou l'ampoule.
11. Aller au chevet de la personne et vérifier l'identité de la personne à l'aide de son bracelet.
 - Éviter les erreurs.
12. Ouvrir l'emballage de l'Opsite.
 - Pour être prêt au moment de l'insertion du papillon et ne pas avoir à l'ouvrir d'une seule main.
13. Déterminer le site d'insertion.
 - Sites privilégiés : thorax, cuisses.
 - Il arrive qu'on installe des papillons sur les bras, mais cela peut être douloureux pour la personne lorsqu'elle est sur le côté.
14. Désinfecter le site d'insertion.
 - Désinfecter la peau en un mouvement circulaire, à partir du centre vers la périphérie.
15. Laisser sécher l'alcool.
 - La personne ressentira moins l'insertion de l'aiguille.
16. Mettre le tampon à côté du site désinfecté.
 - Permettra de localiser facilement le site désinfecté.
17. Mettre les gants jetables.
 - Éviter la contamination.
18. Regrouper les ailettes de l'aiguille vers le haut et les tenir fermement avec la main dominante.
 - Permettre d'avoir une bonne prise sur l'aiguille et permettre d'être bien dans les tissus sous-cutanés.



ÉTAPES

POINTS À RETENIR

19. Mettre le biseau de l'aiguille vers le haut et pincer la peau avec la main non dominante. • *Plus nécessaire* Faciliter l'insertion.
20. Aviser la personne et lui demander de se détendre et d'inspirer profondément. • Afin de détourner son attention.
21. Introduire l'aiguille dans la peau à un angle de 30° jusqu'à la base des ailettes. • Dans certains centres, après avoir inséré le papillon, on le retourne de façon à ce que le biseau soit vers le bas pour éviter la saturation rapide des tissus.
- 20°
22. Fixer les ailettes ainsi que la tubulure à l'aide d'un ou deux op-sites.
23. Inscire la date ainsi que le nom et la concentration du médicament sur l'Opsite. ***important*** • Toujours donner le même médicament avec la même concentration dans le papillon correspondant.
24. Jeter la seringue dans le contenant pour déchets biomédicaux. • **Ne jamais recapuchonner, risque de blessure et de contamination.**
25. Se laver les mains. • Éliminer les microbes.

INSCRIPTION AU DOSSIER :

- Date.
- Heure.
- Le calibre du papillon.
- La sorte de médicament.
- Le nombre de mg/ml.
- La voie d'administration.
- Le site.

Exemple :

2009-05-19	13 :50	Semi-conscient. Gémit à la mobilisation, faciès crispé. -----
	14 :00	Papillon # 23 installé cuisse gauche pour morphine 10 mg/ml
		Morphine donnée. -----
	14 :30	Visage détendu. Calme. -----
		----- <i>Elle Soulagé ét. inf. aux</i> -----