

Nom du pt <i>Rivard Sébastien</i> <i>19XX-02-29</i>		TA Allergie <i>Fruits de mer</i>	<i>Pans cuisse gauche</i> <i>Nettoyer plaie à basse pression avec NaCl, non adhérent + pans sec.</i>
Diagnostic <i>Polytraumatisé</i>			
Médecin <i>??</i>			

ATTENTION : Normalement, la feuille de route et la note d'évolution de l'infirmière ne se retrouvent pas sur la même feuille. Ici, ces 2 documents se retrouvent sur la même feuille par souci d'économie de papier et pour protéger nos arbres.

Date	Heure	Note d'évolution
2017-xx-xx	9h00	Pansement cuisse gauche souillé séreux à 40% sur 2 compresses 4x4. Aucune odeur. Plaie nettoyée à basse pression avec NaCl 0.9%. Pourtour asséché. Mesure 3x4 cm. Présente 90% de tissu de granulation et 10% de tissu épithélial. Aucune douleur, ni rougeur, ni œdème ou chaleur. Refait avec non adhérent + pansement sec et hypafix.
		_____ Sarah Latouche, étudiante inf. aux
		_____ Signature et titre
		_____ Matériel et type de pansement utilisés pour la réfection du pansement

Localisation (site)


Description du pansement antérieur

Produit nettoyant ou désinfectant avec méthode

Critères d'observation de la plaie et son pourtour

Matériel et type de pansement utilisés pour la réfection du pansement

Signature et titre

DÉTAILS NOTE DE PANS	exemples			
Date et heure	2017-12-08 9h00	✓		RÉFÉRENCE : Cemeq page 123
Évaluation de la douleur prn	D.I.R Donné : PQRSTU Intervention : analgésie Résultat : douL.2/10	✓		
Localisation (site)	Pied, coccyx ou abdomen, etc.	✓		Pansement cuisse gauche
Description du pansement antérieur	Nombre de compresses Dimension des compresses (3x3 ou 4x4) Pourcentage (%) Exsudat (cahier de technique p.185) Odeur Particularités	✓		<ul style="list-style-type: none"> • 2 compresses • 4x4 • Souillées 40% • Séreux • Aucune • Ø odeur
Produit désinfectant ou nettoyant avec façon d'utilisation	Compresses NaCl 0,9% ou à basse pression ou à haute pression c NaCl, etc.	✓		Plaie nettoyée à basse pression avec NaCl Pourtour asséché.
Critères d'observation de la plaie et son pourtour	Dimension*, lit de la plaie* (intérieur) et pourtour (DROC)*	✓		Mesure 4 X 3 cm (étant donné qu'on ne peut pas la mesurer exactement, j'ai inventé ces dimensions.)Plaie : tissu de granulation et épithélial, Ø douleur, Ø rougeur, Ø œdème, Ø chaleur.
Type de pansement et matériel utilisé	Comresse 4x4, cavillon, coussinet (pad) abdominal, hypafix, etc.	✓		Refait c non adhérent, 4 x 4X4 + hypafix.
Réaction et collaboration du patient	N'est pas nécessaire s'il n'y a pas de particularité			

À RETENIR

Parfois, on doit mesurer et qualifier la plaie après le nettoyage afin que nos observations soient exactes.

L'utilisation d'une solution antiseptique (ex. Chlorhexidine, Dakin, etc.) peut être nécessaire, pour une période déterminée. Elles sont appliquées en trempette de 5 à 20 minutes et les solutions doivent être rincées avec du NaCl 0.9 % avant de refaire le pansement.

Une technique propre peut être utilisée en milieu de vie, mais la technique stérile doit toujours être privilégiée.