


<p>Nom du pt Lalande, Ginette 19XX-02-29</p> <p>Diagnostic Appendicectomie</p> <p>Médecin M.C. Simard</p>		<p>TA</p> <p>Allergie Péni.</p>	<p>Pans abdo. die</p> <p>Nettoyer plaie avec Nacl, pans sec, Hypafix</p>
--	--	--	--

ATTENTION : Normalement, la feuille de route et la note d'évolution de l'infirmière ne se retrouvent pas sur la même feuille. Ici, ces 2 documents se retrouvent sur la même feuille par souci d'économie de papier et pour protéger nos arbres.

1- Observation et qualification de la douleur		2- Localisation	3- Description du pansement antérieur
Date	Heure	Note d'évolution	
2017-12-10	9h00	Aucune douleur	
		Pansement abdominal droit souillé à 25% sanguin 3 compresses 4x4. 6 sutures en place. Nettoyée avec compresses NaCl 0.9% et asséchée.	
		Aucune rougeur, ni œdème ou chaleur.	
		Pansement sec et hypafix installés.	
		Larouche, étudiante inf. aux	

5- Critères d'observation de la plaie et de son pourtour.

6- Type de pansement et matériel utilisé

DÉTAILS NOTE DE PANS	exemples			
Date et heure	2017-12-08 9h00	✓		RÉFÉRENCE : Cemeq page 123
1- Observation de la douleur prn	D.I.R Donné : PQRSTU Intervention : analgésie Résultat : douL.2/10	✓		
2- Localisation (site)	Pied, coccyx ou abdomen, etc.	✓		Pansement abdominal droit
3- Description du pansement antérieur	Nombre de compresses Dimension des compresses (3x3 ou 4x4) Pourcentage (%) Exsudat (cahier de technique p.185) Odeur Particularités	✓		<ul style="list-style-type: none"> • 3 compresses • 4x4 • Souillées 25% • Sanguin • Aucune • Sutures
4- Produit désinfectant ou nettoyant avec méthode	Compresses NaCl 0,9% ou à basse pression ou à haute pression c NaCl, etc.	✓		Plaie nettoyée c compresses de NaCl
5- Critères d'observation de la plaie et pourtour	Dimension*, lit de la plaie* (intérieur) et pourtour (DROC)*	✓		Plaie Ø douleur, Ø rougeur, Ø œdème, Ø chaleur. Une plaie chirurgicale n'a pas besoin d'être mesurée et ne possède pas de lit de plaie à moins qu'une suture cède et que la plaie s'ouvre.
6- Type de pansement et matériel utilisé	Comresse 4x4, cavillon, coussinet (pad) abdominal, hypafix, etc.	✓		Refait c 3 compresses 4X4 + hypafix.
7- Réaction et collaboration du patient	N'est pas nécessaire s'il n'y a pas de particularité			

À RETENIR

Parfois, on doit mesurer et qualifier la plaie après le nettoyage afin que nos observations soient exactes.

L'utilisation d'une solution antiseptique (ex. Chlorhexidine, Dakin, etc.) peut être nécessaire, pour une période déterminée. Elles sont appliquées en trempette de 5 à 20 minutes et les solutions doivent être rincées avec du NaCl 0.9 % avant de refaire le pansement.

Une technique propre peut être utilisée en milieu de vie, mais la technique stérile doit toujours être privilégiée.